



## *Muntiacus reevesi*

**Synonyma:** *Cervus reevesi*

**České jméno:** muntžak malý

**Anglické jméno:** Muntjac Deer, Reeves' muntjac

**Čeleď:** *Cervidae*



Obr. 1 Muntžak malý. Foto: Karelj

**Původ:** Hory jižní Číny, Tchajwan.

**Sekundární rozšíření:** Introdikován do Japonska, Velké Británie (1894), Irska, Nizozemí a Belgie. Ve Velké Británii stabilní populace.



● Plošné rozšíření ● Lokální rozšíření ● Přítomen (bez bližších inf.) ● Ojedinelý výskyt

Obr. 2 Muntžak malý v Evropě ([www.cabi.org](http://www.cabi.org))

**Rozšíření v ČR:** Není zaznamenán z volné přírody, ale je chován v zoologických zahradách (v roce 2015 6 ZOO chovalo 27 kusů) i privátně.

**Cesty zavlečení:** Záměrně jako obohacení fauny (myslivost) a následné spontánní šíření. Další možností je únik z chovů - ZOO, soukromí chovatelé (Francie).

**Popis:** Tělo je zhruba 70-90 cm dlouhé, výška v kohoutku přibližně 40-50 cm, ocas zhruba 12 cm. Dospělí samci váží kolem 15 kg, samice bývají cca o 3 kg lehčí. Samci mají jednoduché, většinou nevětvené parůžky cca 10 cm dlouhé, s nápadnými pučnicemi (8 – 10 cm). Také mají prodloužené horní špičáky (cca 2 cm), oproti samicím, u kterých dorůstají jen asi 0,5 cm. Mají krátkou, hladkou, hustou, leskle kaštanovou srst, samci bývají v oblasti hlavy a krku tmavší. Břicho je u mláďat světle šedé, s přibývajícím věkem šedne a tmavne. Podél přední strany pučnic jsou tmavohnědé pruhy (kresba tvaru V), vnitřní strana boltců, brada, hrdlo, zadní část břicha a vnitřní strana končetin, zadní část tváří a dolní strana ocasu jsou bílé. Zimní šat (od října do dubna) je tmavší než letní. Malé parůžky jsou shazovány v květnu nebo červnu a znova dorůstají v říjnu nebo listopadu. Při útěku vyniká bílé zrcátko pod ocasem.



Obr. 3 Mladý samec. Foto: Jackie Pringle



Obr. 4 Samice. Foto: Jackie Pringle

Živí se bylinami, listím keřů a stromů a pupeny. V zimě vyžaduje i potravu bohatou na bílkoviny a nerostné látky. Zřejmě by nepřežil kontinentální zimu. Vázaný na hustý podrost, ve kterém se nejčastěji pohybuje, zejména za soumraku. Jde o samotářské zvíře, jedinci se potkávají pouze v době rozmnožování. Říje probíhá v lednu a únoru. Březost trvá 7 měsíců a mládě váží při narození přibližně 1 kg. Je pokryto žlutavými skvrnami na kaštanovém pozadí. Rodí se vždy jediné mládě, které je kojeno čtvrt roku a drží se matky, dokud se nenarodí další. Samec se ozývá drsným, ostrým, helekavým štěkotem, pro který bývá také nazýván „štěkavý jelen“.


**Rizika:** Škody v lesích a zahradách způsobené okusem. Možnost kolize s automobily na silnicích.



Obr. 5 Samice – zimní šat. Foto: Jackie Pringle



**Možnosti záměny:** Srnec obecný (*Capreolus capreolus*) je větší (v kohoutku cca 60 – 75 cm), nemá tmavé pruhy tvaru V na hlavě. Také má kratší ocas a jeho okolí je bílé (u muntžaka bílá barva jen pod ocasem). Samci mají větvené parohy.



Obr. 6 Porovnání zadní části srnce (vlevo) a muntžaka



Obr. 7 Srnec obecný. Foto: Jojo

**Likvidace:** Odstřel, případně odchyt do pastí.

#### **Zdroje:**

Hofrichterová A., Zeman P. a kol. (2016): Ročenka Unie českých a slovenských zoologických zahrad 2015. Zoo Praha, Praha, 406 pp.

<http://www.chovzvirat.cz/zvire/2902-muntzak-maly/>

<http://www.cabi.org/isc/datasheet/74281> - i Obr. 3 - 5

Muntjac Deer - Fact sheet, NNSS, [www.nonnativespecies.org](http://www.nonnativespecies.org) – i Obr. 6

Obr. 1: Karelj: Muntžak malý v Pražské zoologické zahradě [30.8.2016] Dostupné na:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muntiacus\\_reevesi\\_Zoo\\_Praha\\_2011-5.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muntiacus_reevesi_Zoo_Praha_2011-5.jpg)

Obr. 7: Jojo: *Capreolus capreolus* [30.8.2016] Dostupné na:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus\\_capreolus\\_Jojo.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_Jojo.jpg)

**Autor:** Tomáš Görner, AOPK ČR ([tomas.gorner@nature.cz](mailto:tomas.gorner@nature.cz))

**Vytvořeno:** 30. 8. 2016